

Tomar Joenja, el **primer** y único tratamiento **aprobado por la FDA** para APDS, es tan fácil como...

1 tableta de 70 mg **2** veces al día **3** formas de asegurarse que cada dosis cuenta

Establecer una rutina de tratamiento con Joenja



Tome sus tabletas de Joenja con unas **12 horas de diferencia** en momentos que normalmente son convenientes



Configure 2 recordatorios, uno por la mañana y otro por la noche



Guarde sus tabletas de Joenja en el **mismo lugar** para que siempre sepa dónde están

APDS, síndrome PI3K delta activada

Joenja
leniolisib
REALZAR LA ESPERANZA

Uso Aprobado

JOENJA® (leniolisib) es un medicamento recetado que se utiliza para el tratamiento de síndrome de fosfoinosítido 3-quinasa delta activada (PI3Kδ) (APDS) en adultos y niños de 12 años de edad en adelante.

Información de seguridad selecta

Informe a su proveedor de atención médica si está embarazada o planea quedar embarazada. JOENJA puede hacerle daño a su bebé nonato. Su proveedor de atención médica le hará una prueba de embarazo antes de que comience a tomar JOENJA.

Use un método anticonceptivo eficaz para prevenir el embarazo mientras tome JOENJA y durante una semana después de dejar de tomar JOENJA. Si planea quedar embarazada, continúe tomando su anticonceptivo durante una semana después de suspender JOENJA. Hable con su médico sobre qué tipo de método anticonceptivo es adecuado para usted mientras toma JOENJA.

Consulte la Información de Seguridad Selecta adicional en todo momento. Para obtener más información, consulte la Información de prescripción completa.

Empezar con Joenja

Joenja
leniolisib
REALZAR LA ESPERANZA

¿Cómo tomo Joenja?

Joenja es una tableta oral, que se toma dos veces al día, en cualquier momento y en cualquier lugar.

- Tome Joenja exactamente como su médico le indique
- Tome 1 tableta de Joenja por la mañana, espere unas 12 horas y tome la segunda tableta por la noche. Joenja se puede tomar con o sin alimentos
- Si olvida una dosis de Joenja por más de 6 horas, tome la siguiente dosis a su hora habitual
- Si se producen vómitos en el plazo de 1 hora después de tomar Joenja, tome otra tableta tan pronto como pueda
- Si se producen vómitos más de 1 hora después de recibir la dosis, espere y tome la siguiente dosis a la hora habitual



¡Nunca pierda una dosis!

Descargue el tono de recordatorio gratuito de Joenja hoy en www.Joenja.com

Información de seguridad selecta (cont.)

No se sabe si JOENJA pasa a la leche materna. Hable con su médico sobre la mejor manera de alimentar a su bebé si toma JOENJA.

Consulte la Información de Seguridad Selecta adicional en todo momento. Para obtener más información, consulte la [Información de prescripción completa](#).

No es un paciente real



¿Tengo que seguir tomando Joenja?

- **NO** deje de tomar Joenja sin hablar con su médico. Siempre hable con su médico antes de realizar cambios o tomar decisiones de tratamiento
- Tome Joenja dos veces al día, todos los días, para mantener su APDS bajo control, incluso si lo hace sentir mejor

¿Puedo tomar Joenja con mis otros medicamentos?

- Joenja y ciertos medicamentos pueden interactuar entre sí. Informe a su médico sobre los medicamentos que toma. Podrían afectar el funcionamiento de Joenja

Esta información está destinada a ayudarlo a tener la mejor experiencia posible mientras toma Joenja. Esta guía no reemplaza el hablar con su médico acerca de su condición médica o su tratamiento.

Información de seguridad selecta (cont.)

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluyendo los de prescripción, medicamentos sin receta, vitaminas y suplementos herbales. JOENJA y ciertos medicamentos pueden afectarse entre sí.

Informe a su proveedor de atención médica si tiene programado recibir una inmunización (vacuna).

JOENJA puede afectar la eficacia de la vacuna. Conozca los medicamentos que toma. Mantenga una lista de sus medicamentos y muéstrese la a su proveedor de atención médica y farmacéutico cuando reciba un medicamento nuevo.

Consulte la Información de Seguridad Selecta adicional en todo momento. Para obtener más información, consulte la Información de prescripción completa.

Información de seguridad selecta (cont.)

Los efectos secundarios más comunes de JOENJA incluyen dolor de cabeza, inflamación de los senos nasales y piel seca, con picazón e inflamación (eccema). Estos no son todos los efectos secundarios posibles de JOENJA. Informe a su proveedor de atención médica sobre cualquier efecto secundario que le moleste o que no desaparezca. También puede reportar los efectos secundarios negativos a la FDA al 1-800-FDA-1088 o www.fda.gov/medwatch, o a Pharming Medical Affairs al (800) 930-5221.

Consulte la Información de Seguridad Selecta adicional en todo momento. Para obtener más información, consulte la [Información de prescripción completa](#).

No son pacientes reales.



¿Qué pasa si necesito ayuda para conseguir Joenja?

APDS Assist está aquí para guiarlo en sus necesidades de tratamiento.

Para comunicarse con un Coordinador de Atención de APDS Assist, llame al 1-877-796- APDS (2737) entre las 8 am y las 8 pm ET, de lunes a viernes.

Visite www.Joenja.com para obtener más información y preguntar a su médico sobre la inscripción.



Enfóquese en las
cosas que ama.
Joenja puede ayudar a
controlar su APDS.